

Inyección de lixisenatida

Marca(s): Adlyxin[®], Soliqua[®] (como combinación de productos que contiene insulina glargina y lixisenatida)

¿PARA CUÁLES condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La inyección de lixisenatida se usa junto con dieta y ejercicio para tratar la diabetes tipo 2 (afección en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre). La inyección de lixisenatida no se usa para tratar la diabetes tipo 1 (afección en la que el cuerpo no produce la insulina y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre). La lixisenatida no se usa en lugar de la insulina para tratar a las personas que tienen diabetes y que necesitan insulina. La inyección de lixisenatida pertenece a una clase de medicamentos llamados miméticos de la incretina. Funciona al estimular el páncreas para secretar insulina cuando los niveles de azúcar en la sangre son altos. La insulina ayuda trasladar el azúcar de la sangre a otros tejidos del cuerpo en donde se usa para obtener energía. La inyección de lixisenatida también retrasa el vaciado del estómago y ocasiona una disminución en el apetito.

Con el tiempo, las personas que tienen diabetes y azúcar alta en la sangre pueden desarrollar complicaciones graves o mortales, incluyendo enfermedades del corazón, apoplejías, problemas renales, daño a los nervios y problemas de la vista. Usar medicamentos, realizar cambios al estilo de vida (por ejemplo, dieta, ejercicios, dejar de fumar) y verificar regularmente su azúcar en sangre puede ayudarle a controlar su diabetes y mejorar su salud. Esta terapia también puede reducir las posibilidades de sufrir un infarto, apoplejía u otras complicaciones relacionadas con la diabetes como insuficiencia renal, daño a los nervios (entumecimiento, piernas o pies fríos, disminución en la capacidad sexual en hombres y mujeres), problemas de la vista, incluyendo daños o pérdida de la vista o enfermedad de las encías. Su médico y otros proveedores de cuidado de

salud hablarán con usted sobre la mejor manera para controlar la diabetes.

Su médico o farmacéutico le dará la hoja del fabricante con información para el paciente (Guía del medicamento) cuando inicie su tratamiento con inyección de lixisenatida y cada vez que vuelva a surtir su receta médica. Lea la información atentamente y si tiene alguna duda, pregúntele a su médico o farmacéutico. También puede visitar el sitio web de la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>) para obtener la Guía del medicamento.

¿CÓMO se debe usar este medicamento?

La presentación de la inyección de lixisenatida es como un inyector de dosis prellenada para inyectar de forma subcutánea (debajo de la piel). Por lo general se inyecta una vez al día, una hora (60 minutos) antes de la primera comida del día. Use la inyección de lixisenatida aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Use la inyección de lixisenatida exactamente como se le indica. No use una cantidad mayor ni menor del medicamento, ni lo use con más frecuencia de la que su médico le indique.

Su médico probablemente le dirá que inicie con una dosis baja de lixisenatida y aumente su dosis después de 14 días.

La inyección de lixisenatida controla la diabetes, pero no la cura. Continúe usando la inyección de lixisenatida incluso si se siente bien. No deje de usar la inyección de lixisenatida sin hablar antes con su médico.

Deberá comprar agujas por separado. Pregúntele a su médico o farmacéutico qué tipo de agujas necesitará para inyectarse el medicamento. Asegúrese de leer y entender las instrucciones del fabricante para inyectar la lixisenatida. Además asegúrese de que sabe cómo y

Este folleto no contiene toda la información posible sobre este medicamento. Su médico o farmacéutico puede dar información adicional para responder a cualquier pregunta que pueda tener.

AHFS[®] Patient Medication Information. © Copyright, 2017. The American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Bethesda, Maryland. Todos los derechos reservados. La duplicación de uso comercial, deberá ser autorizada por ASHP.



Inyección de lixisenatida (continuó)

cuándo preparar un nuevo inyector. Si usted está ciego o tiene mala visión, no use este inyector sin ayuda. Pídale a su médico o farmacéutico que le enseñe cómo usar el inyector. Siga las instrucciones atentamente.

Siempre observe la solución de lixisenatida antes de inyectarla. Debe estar clara, incolora y sin partículas. No utilice la lixisenatida si tiene algún color, está turbia, espesa o contiene partículas sólidas o si ya pasó la fecha de vencimiento en el inyector.

La inyección de lixisenatida se puede administrar en el muslo (parte superior de la pierna), abdomen (área del estómago) o en la parte superior del brazo. Use un lugar distinto para cada inyección. Si el inyector está almacenado en el refrigerador, permita que el inyector se caliente a temperatura ambiente antes de usarlo.

Nunca vuelva a utilizar las agujas o inyectores y nunca los comparta. Siempre retire la aguja inmediatamente después de inyectar su dosis. Tire las agujas en un recipiente resistente a las perforaciones. Pregunte a su médico o farmacéutico cómo deshacerse del recipiente resistente a perforaciones.

¿Qué OTRO USO se le da a este medicamento?

Este medicamento se puede recetar para otros usos; para obtener más información pregunte a su médico o farmacéutico.

¿Cuáles son las PRECAUCIONES ESPECIALES que debo seguir?

Antes que use la inyección de lixisenatida,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la lixisenatida, exenatida (Bydureon, Byetta), liraglutida (Saxenda, Victoza), a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que contiene la inyección de lixisenatida. Pregunte a su farmacéutico o revise la Guía del medicamento para obtener una lista de los ingredientes.
- Informe a su médico y farmacéutico acerca de qué medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o tiene planificado tomar. Es particularmente importante decirle a su médico

todos los medicamentos que toma por vía oral, ya que la lixisenatida puede cambiar la manera en que su cuerpo absorbe estos medicamentos. Si está tomando medicamentos para el dolor como acetaminofén (Tylenol), o antibióticos, tómelos al menos una hora antes de la inyección de lixisenatida. Si está tomando anticonceptivos orales (píldoras para evitar embarazos) tómelos al menos 1 hora antes u 11 horas después de usar la inyección de lixisenatida. Además, asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes medicamentos: clorpropamida (Diabinese), digoxina (Lanoxin), glimepirida (Amaryl, en Duetact), glipizida (Glucotrol), gliburida (Diabeta, Glynase, en Glucovance), insulina, tolazamida, y tolbutamida. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus medicamentos o supervisarle atentamente para saber si sufre efectos secundarios.

- Informe a su médico si bebe o alguna vez ha bebido grandes cantidades de alcohol; o si tiene o alguna vez ha tenido problemas estomacales graves, incluyendo gastroparesis (movimientos lentos de la comida desde estómago al intestino delgado) o problemas para digerir los alimentos; pancreatitis (inflamación del páncreas); cálculos biliares (depósitos sólidos que se forman en la vesícula biliar); o enfermedades renales.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene planificado quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras recibe la inyección de lixisenatida, llame a su médico.
- Pregunte a su médico qué hacer si hay un gran cambio en su dieta, ejercicio o peso, o si se enferma, tiene una infección o fiebre, experimenta estrés inusual o se lesiona. Estos cambios y condiciones pueden afectar el azúcar en la sangre y la cantidad de la inyección de lixisenatida que pueda necesitar.

¿Qué DIETA ESPECIAL debo seguir mientras tomo este medicamento?

Asegúrese de seguir todas las recomendaciones de ejercicios y dieta que le haga su médico o nutricionista. Es importante que coma una dieta saludable.

¿Qué tengo que hacer SI ME OLVIDO de tomar una dosis?

Este folleto no contiene toda la información posible sobre este medicamento. Su médico o farmacéutico puede dar información adicional para responder a cualquier pregunta que pueda tener.

Inyección de lixisenatida (continuó)

Inyecte la dosis omitida en un período de 1 hora (60 minutos) antes de su próxima comida. Sin embargo, si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la que olvidó y continúe con su programa normal de dosificación. No inyecte una dosis doble para compensar la que omitió.

¿Cuáles son los EFECTOS SECUNDARIOS que podría provocar este medicamento?

Este medicamento puede ocasionar cambios en el azúcar en sangre. Deberá conocer cuáles son los síntomas de la azúcar alta o baja en la sangre y qué hacer si tiene estos síntomas.

La inyección de lixisenatida puede causar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es intenso o no desaparecen:

- náusea,
- vómitos,
- diarrea,
- estreñimiento,
- indigestión,
- distensión abdominal,
- dolor de cabeza,
- dolor, picazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección.

Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de usar la inyección de lixisenatida y llame a su médico inmediatamente o busque tratamiento médico de emergencia:

- dolor continuo que empieza en la parte superior izquierda o en el centro del estómago, pero que puede extenderse a la espalda, con o sin vómitos;
- urticaria;
- sarpullido;
- picazón;
- ritmo cardíaco con palpitaciones;
- desmayos o sensación de mareo;

- inflamación de los ojos, el rostro, la boca, la lengua, la garganta, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas;
- dificultad para tragar o respirar;
- ronquera;
- micción menos frecuente;
- boca o piel muy seca o sed intensa.

La inyección de lixisenatida puede causar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras usa este medicamento.

Si desarrolla un efecto secundario grave, usted o su doctor puede enviar un informe al programa de divulgación de efectos adversos 'MedWatch' de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) en la página de Internet (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>) o por teléfono al 1-800-332-1088.

¿Cómo debo ALMACENAR o DISPONER de este medicamento?

Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños. Almacénelo lejos de la luz, el calor, el polvo y la suciedad. Almacene los inyectores de lixisenatida en el refrigerador (36 °F a 46 °F [2 °C a 8 °C]). Una vez que el inyector de lixisenatida esté en uso, almacénelo a temperatura ambiente (por debajo de 86 °F [30 °C]) con la tapa puesta. No lo congele. No use la lixisenatida si se ha congelado. Deseche los inyectores de lixisenatida en un recipiente resistente a las perforaciones después de 14 días de su primer uso, incluso si hay algo de solución aún en el inyector.

Cuando viaje, asegúrese de mantener los inyectores de lixisenatida secos. Los inyectores no usados se deben refrigerar o mantener a temperatura fría entre 36 °F a 46 °F (2 °C a 8 °C). Los inyectores que están en uso se pueden guardar a temperatura ambiente hasta 86 °F [30 °C] (no en la guantera del carro ni en otro lugar caliente).

Los medicamentos que ya no son necesarios se deben desechar de una manera apropiada para asegurarse de que las mascotas, los niños

Este folleto no contiene toda la información posible sobre este medicamento. Su médico o farmacéutico puede dar información adicional para responder a cualquier pregunta que pueda tener.

Inyección de lixisenatida (continuó)

y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe desechar estos medicamentos por el inodoro. En su lugar, la mejor manera de deshacerse de sus medicamentos es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o póngase en contacto con su departamento de basura/reciclaje local para conocer acerca de los programas de devolución de medicamentos de su comunidad. Consulte el sitio web de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), (<http://goo.gl/c4Rm4p>) para obtener más información de cómo desechar de forma segura los medicamentos, si no tiene acceso al programa de devolución de medicamentos.

No deje que nadie más use su medicamento. Pregunte a su farmacéutico cualquier duda que tenga sobre cómo volver a surtir su receta médica.

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia.

© Copyright 15 Marzo 2017.

¿Qué debo hacer en caso de una SOBREDOSIS?

En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.

Los síntomas de una sobredosis pueden incluir los siguientes:

- náusea,
- vómitos,
- diarrea,
- dolor abdominal o hinchazón,
- indigestión,
- estreñimiento.

¿Qué OTRA INFORMACIÓN de importancia debería saber

Asista a todas las citas con su médico y a las del laboratorio. Su azúcar en sangre y hemoglobina glucosilada (HbA1c) deberán verificarse regularmente para determinar su respuesta a la inyección de lixisenatida. Su médico le indicará cómo verificar en casa su respuesta a este medicamento al medir sus niveles de azúcar en la sangre u orina. Siga estas instrucciones atentamente.

Este folleto no contiene toda la información posible sobre este medicamento. Su médico o farmacéutico puede dar información adicional para responder a cualquier pregunta que pueda tener.